

Инструкция по применению

Состав

Действующие вещества: хлорамфеникол 0,75 г, метилурацил 4,0 г,

Вспомогательные вещества: полиэтиленоксид 1500, полиэтиленоксид 400 до 100 г,

Лекарственная форма

Мазь

Описание

Мазь для наружного применения белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

Действие

Препарат с антибактериальным и улучшающим регенерацию тканей действием для наружного применения

Фармакодинамика

Комбинированное лекарственное средство для местного применения, оказывает противовоспалительное (дегидратирующее) и противомикробное действие, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (стафилококков, синегнойных и кишечных палочек).

Фармакокинетика

Легко проникает в глубь тканей без повреждения биологических мембран, стимулирует процессы регенерации.

В присутствии гноя и некротических масс антибактериальное действие сохраняется. Диоксометилтетрагидропиримидин, нормализуя нуклеиновый обмен, стимулирует процессы регенерации в ранах, рост и грануляционное созревание ткани, эпителизацию, оказывает противовоспалительное (дегидратирующее) действие.

Показания к применению

гнойные раны (в т.ч. инфицированные смешанной микрофлорой) в первой (гнойно-некротической) фазе раневого процесса.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат разрешен к применению у беременных и кормящих женщин, поскольку он используется местно, не всасывается в системный кровоток при небольших площадях поражения, и не оказывает системного действия. В период беременности и кормления грудью Левомеколь можно использовать в следующих случаях: 1. Для лечения гайморита и отита. 2. Для обработки порезов, ссадин, укусов комаров и мошек, небольших ожогов, вросших ногтей, воспалений после обрезного маникюра и т.д.

Применение у детей

Применение противопоказано у детей до 1 года (у новорожденных биотрансформация хлорамфеникола происходит более медленно, чем у взрослых).

Побочные действия

Местные аллергические реакции.

Взаимодействие

Случаи **взаимодействия** или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

Способ применения и дозы

Наружно. Препаратом пропитывают стерильные марлевые салфетки, которыми рыхло заполняют рану. Возможно введение в гнойные полости через катетер (дренажную трубку) с помощью шприца. В этом случае мазь предварительно подогревают до 35-36 °С. перевязки производят ежедневно, до полного очищения раны от гнойно-некротических масс.

Передозировка

случаи передозировки не выявлены

Особые указания

При нанесении на обширные участки кожи и длительных курсах лечения, необходимо проводить клинический анализ крови.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность управлять автомобилем и движущимися механизмами.

Форма выпуска

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

30 г - тубы полиэтиленовые ламинатные (1) - пачки картонные.

40 г - тубы полиэтиленовые ламинатные (1) - пачки картонные.

50 г - тубы полиэтиленовые ламинатные (1) - пачки картонные.

Условия отпуска из аптек

Отпускается без рецепта

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 20 С

Срок годности

3 года 6 мес

Производитель и организация, принимающие претензии потребителей

НИЖФАРМ, АО (Россия)