

# Инструкция по применению

## Состав

диокси́д кремния, янтарная кислота  
Лекарственная форма

Порошок от 2 г до 100 г.

## Показания к применению

Для реализации населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети в качестве биологически активной добавки к пище - источника янтарной кислоты.

## Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, кровотечения из желудочно-кишечного тракта, атония кишечника.

## Способ применения и дозы

Взрослым по 2 чайных ложки (2 г) 2 раза в день. Продолжительность приема - 7-10 дней.

## Особые указания

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

## Форма выпуска

в инд. Уп

## Условия отпуска из аптек

Без рецепта

## Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

## Срок годности

2,5 года.

Производитель и организация, принимающие претензии потребителей

Полисорб, ЗАО Российская Федерация 454084, г. Челябинск, пр. Победы, д. 168  
(адрес производства: Челябинская обл., г. Копейск, п. Потанино, ул. Томская, 14)