

Инструкция по применению

Состав

На 100 мл спрея для местного применения дозированного 0,255 мг/доза:

Активный ингредиент - бензидамина гидрохлорид - 0,15 г

Вспомогательные вещества: этанол 96%, глицерол, метилпарагидроксибензоат, ароматизатор ментоловый (вкусовая добавка), сахарин, натрия гидрокарбонат, полисорбат 20, очищенная вода.

Лекарственная форма

Спрей для местного применения дозированный.

Описание

Бесцветная прозрачная жидкость с характерным запахом мяты.

Фармакодинамика

Бензидамин является нестероидным противовоспалительным препаратом, принадлежит к группе индазолов. Оказывает противовоспалительное и местное обезболивающее действие, обладает антисептическим действием против широкого спектра микроорганизмов.

Механизм действия препарата связан со стабилизацией клеточных мембран и ингибированием синтеза простагландинов.

Бензидамин оказывает антибактериальное и специфическое антимикробное действие за счет быстрого проникновения через мембраны микроорганизмов с последующим повреждением клеточных структур, нарушением метаболических процессов и лизисом клетки.

Обладает противогрибковым действием в отношении *Candida Albicans*. Вызывает структурные модификации клеточной стенки грибов и метаболических цепей мицетов, таким образом препятствует их репродукции, что явилось основанием для применения бензидамина при воспалительных процессах в ротовой полости, включая инфекционную этиологию.

Фармакокинетика

При местном применении препарат хорошо абсорбируется через слизистые оболочки и проникает в воспаленные ткани.

Экскреция препарата происходит в основном почками и через кишечник в виде метаболитов или продуктов конъюгации.

Лекарственные формы для местного применения не обладают системным действием и не проникают в грудное молоко.

Показания к применению

Воспалительные заболевания полости рта и ЛОР-органов (различной этиологии):

- гингивит, глоссит, стоматит (в т.ч. после лучевой и химиотерапии),
- ангина, фарингит, ларингит, тонзиллит,
- кандидоз слизистой оболочки полости рта (в составе комбинированной терапии),
- калькулезное воспаление слюнных желез.
- после оперативных вмешательств и травм (тонзиллэктомия, переломы челюсти),
- после лечения или удаления зубов,
- пародонтоз,

При инфекционных и воспалительных заболеваниях, требующих системного лечения, необходимо применение Тантум Верде в составе комбинированной терапии.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата,
- детский возраст до 3 лет,

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно использование препарата во время беременности и лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Местные реакции: сухость во рту, чувство онемения, жжения в ротовой полости.

Аллергические реакции: кожная сыпь.

Очень редко: ларингоспазм.

Взаимодействие

Не установлено клинически значимого взаимодействия препарата Тантум Верде с другими лекарственными средствами.

Способ применения и дозы

Взрослым и больным пожилого возраста назначают по 4-8 доз каждые 1,5-3 ч,

- детям в возрасте 3-6 лет - по 1 - 4 дозы (максимально - 4 дозы) каждые 1,5-3 ч,

- детям в возрасте 6-12 лет- по 4 дозы каждые 1,5-3 ч.

Курс лечения:

- при воспалительных заболеваниях полости рта и ЛОР-органов (различной этиологии): от 4 до 15 дней,

- при одонто-стоматологической патологии: от 6 до 25 дней,

- после оперативных вмешательств и травм (тонзиллэктомия, переломы челюсти) при применении спрея и раствора: от 4 до 7 дней.

При применении препарата в течение длительных сроков, необходима консультация врача.

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препарата Тантум Верде не сообщалось.

Особые указания

Следует избегать попадания спрея в глаза.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность управлять автотранспортом и иную деятельность требующую повышенного внимания.

Форма выпуска

Спрей для местного применения дозированный.

Упаковка

- 30 мл (176 доз) раствора во флаконе из полиэтилена белого цвета, снабженном помпой и нажимным устройством со складывающейся канюлей.

-1 флакон вместе с инструкцией по применению помещены в картонную пачку.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Условия хранения

При температуре не выше 25С, в защищенном от света месте.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

4 года. Не использовать по истечении срока годности.

Производитель и организация, принимающие претензии потребителей

АЗИЕНДЕ КИМИКЕ РИУНИТЕ АНЖЕЛИНИ ФРАНЧЕСКО А.К.Р.А.Ф. С.П.А