

Инструкция по применению

Состав

1 таблетка содержит фенибут 250 мг

Фармакокинетика

Фенибут - ноотропный препарат.

Устраняет напряженность, беспокойство и страх, улучшает сон. Удлиняет латентный период и укорачивает продолжительность и выраженность нистагма, оказывает антиэпилептическое действие.

Уменьшает проявления астении и вазовегетативные симптомы, в т.ч. головную боль, чувство тяжести в голове, нарушение сна, раздражительность, эмоциональную лабильность, повышает умственную работоспособность.

Улучшает психологические показатели: внимание, память, скорость и точность сенсорно-моторных реакций.

У пациентов с первых дней терапии улучшается самочувствие, повышается интерес и инициатива, мотивация деятельности.

При применении Фенибута после тяжелых черепно-мозговых травм увеличивается количество митохондрий в перифокальных областях и улучшается течение биоэнергетических процессов в головном мозге.

Фенибут оказывает также антиоксидантное действие.

При применении у лиц пожилого возраста Фенибут не вызывает загруженности и чрезмерной вялости.

Нормализует процессы пероксидации липидов. Не влияет на холино- и адренорецепторы.

Показания к применению

- Астенические и тревожно-невротические состояния, тревожность, страх, невроз навязчивых состояний, психопатия.
- Заикание и тики у детей, энурез.
- Задержка мочи на фоне миелодисплазий.
- Бессонница и кошмарные сновидения у лиц пожилого возраста.
- Профилактика тревожных состояний, возникающих перед хирургическими вмешательствами и болезненными диагностическими исследованиями (премедикация).
- Болезнь Меньера, головокружения, связанные с дисфункциями вестибулярного анализатора различного генеза (в т.ч. при отогенном лабиринтите, сосудистых и травматических нарушениях), профилактика укачиваний при кинетозах.

- Первичная открытоугольная глаукома (в составе комбинированной терапии).
- В качестве вспомогательной терапии при лечении алкоголизма (для купирования психопатологических и соматовегетативных расстройств при абстинентном синдроме).
- Лечение пределириозных и делириозных состояний при алкоголизме (в комбинации с общепринятыми дезинтоксикационными средствами).

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость,
Детский возраст до 2 лет,
Беременность, лактация.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при беременности (1 триместр), грудном вскармливании.

Побочные действия

Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд. Со стороны ЦНС: усиление раздражительности, возбуждение, тревожность, головокружение, головная боль, сонливость. Со стороны пищеварительной системы: тошнота (при первых приемах).

Взаимодействие

При совместном применении Фенибут удлиняет и усиливает действие снотворных, нейролептиков, противосудорожных препаратов, опиоидных анальгетиков.

Способ применения и дозы

Фенибут применяют внутрь до еды, курсом 4-6 нед.

Взрослым препарат назначают в средней дозе 250-500 мг 3 раза/сут, при необходимости дозу увеличивают до 2.5 г/сут. Максимальная разовая доза 750 мг, для лиц старше 60 лет 500 мг.

Детям от 2 до 8 лет - по 50-100 мг 3 раза/сут, максимальная разовая доза 150 мг, детям 8-14 лет - по 250 мг 3 раза/сут, максимальная разовая доза 300 мг

Для купирования алкогольного абстинентного синдрома в первые дни терапии препарат назначают по 250-500 мг 3 раза в течение дня и 750 мг на ночь, с постепенным снижением суточной дозы до обычной для взрослых.

При отогенном лабиринтите и болезни Меньера в период обострения - по 750 мг 3-4 раза/сут в течение 5-7 дней, при снижении выраженности вестибулярных расстройств по 250-500 мг 3 раза/сут в течение 5-7 дней и затем по 250 мг 1 раз/сут в течение 5 дней. При легком течении заболеваний по 250 мг 2 раза/сут в

течение 5-7 дней, с последующим снижением дозы до 250 мг 1 раз/сут в течение 7-10 дней.

Для лечения головокружения при нарушениях вестибулярного аппарата сосудистого и травматического генеза - по 250 мг 3 раза/сут в течение 12 дней.

Для профилактики кинетозов - 250-500 мг однократно за 1 ч до предполагаемого путешествия (эффект имеет дозозависимый характер).

Передозировка

Симптомы: рвота, артериальная гипотензия, сонливость, тошнота, почечная недостаточность. При длительном применении Фенибута в суточной дозе 7-14 г возможно развитие гепатотоксического действия (в т.ч. жировой дистрофии печени), эозинофилии. Лечение: промывание желудка, симптоматическая и поддерживающая терапия.

Особые указания

С осторожностью назначают препарат при эрозивно-язвенных поражениях ЖКТ.

При длительном применении необходимо контролировать показатели функции печени и картину периферической крови.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Необходимо воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 С

Срок годности

3 года