

# Инструкция по применению

## Состав

Саше А Кукурузный мальтодекстрин 1900 мг. *Lactobacillus rhamnosus* GG 100 мг.

Саше В Глюкоза 3020 мг. Натрия цитрат 580 мг. Натрия хлорид 360 мг. Калия хлорид 300 мг.

Ароматизатор клубничный 120 мг. Кремния диоксид 10 мг. Сукралоза 10 мг.

## Фармакодинамика

Натрия цитрат, натрия хлорид и калия хлорид способствуют восстановлению водно-электролитного баланса.

Обычно недостаток электролитов в организме наблюдается при состояниях, связанных с потерей жидкости организмом,

например, при диарее, обезвоживании, высокой температуре и т.д. Глюкоза является источником энергии, обеспечивающим основные потребности организма.

Лиофилизированные бактерии *Lactobacillus rhamnosus* GG способствуют восстановлению и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника.

Мальтодекстрин является пребиотическим компонентом и стимулирует рост нормальной микрофлоры кишечника.

## Показания к применению

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище, способствующей восстановлению водно-электролитного баланса, а также поддержанию нормальной микрофлоры кишечника.

## Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов. Детский возраст до 3-х лет.

## Применение у детей

Противопоказан в детском возрасте до 3 лет.

## Способ применения и дозы

Содержимое двух саше (А и Б) растворяют в 200 мл воды комнатной температуры и принимают внутрь.

Если нет уверенности, что вода пригодна для питья, ее следует вскипятить и охладить перед приготовлением раствора.

Концентрация солей и глюкозы в готовом растворе способствует оптимальному всасыванию активных веществ.

Взрослым и детям старше 3 лет Регидрон Био следует применять в соответствии с данными, приведенными в таблице.

## **Передозировка**

Симптомы: при введении раствора Регидрона в большом объеме или чрезмерной концентрации возможна гипернатриемия (слабость, нервно-мышечное возбуждение, сонливость, спутанность сознания, кома, иногда даже остановка дыхания), у пациентов с нарушением функции почек возможно развитие метаболического алкалоза, что проявляется в снижении вентиляции легких, нервно-мышечном возбуждении и тетанических судорогах.

Лечение: в случае значительной передозировки требуется контроль врача. Коррекцию баланса электролитов и жидкости следует проводить на основании данных лабораторных исследований.

## **Форма выпуска**

В 1 пакете 6,4 г порошка. В упаковке 5 парных саше (А+Б).

## **Условия отпуска из аптек**

Отпускается без рецепта

## **Условия хранения**

Регидрон Био следует хранить в сухом месте при комнатной температуре. Не использовать после срока годности, указанного на упаковке.

После разведения раствор хранят в холодильнике при температуре 2-8°C в течение 24 ч.

## **Срок годности**

2 года.

## **Производитель и организация, принимающие претензии потребителей**

ООО "Орион Фарма" в Москве 119034, Москва, Сеченовский пер., 6, стр. 3, эт. 3

Тел. +7 495 363 50 71, 363 50 72, 363 50 73, 363 50 76 Факс +7 495 363 50 74

Email [orion@orionpharma.ru](mailto:orion@orionpharma.ru)